

Tableau 1. Les épidémies de méningite à méningocoque de 1970 à 1996

Pays Territoire	Année	Nbre de cas	Taux d'attaque p. 100.000 h	% décès	Séro-groupe
Finlande	1973-74*	1.300*	14,6	4,3	A
Norvège (nord)	1975*-78	404	23,9*	13,7	B
Islande	1976	86	37,7	10,3	B
Iles Féroé	1980-81*	74	95,0*	ND	B
<b>AMERIQUE CENTRALE ET AMERIQUE DU SUD</b>					
Chili, Iquique	1986	46	31,2	ND	B
Brésil, Sao Paulo	1971-72	2.005	11	ND	C
Brésil, Sao Paulo	1974	30.555	370,0	ND	A
Cuba	1980-84*	ND	14,4*	14,9	B
<b>ASIE</b>					
Mongolie	1973-74	ND	141,0	11,8-194,0*	A
Viet Nam, Ho Chi Minh	1977	1.015	>20,0	27,4	C
Népal, Kathmandu	1983	875	103,0	10,9	A
<b>AFRIQUE</b>					
Nigéria, Zaria	1977	1.257	360,0	8,3	A
Rwanda					
Ruhengeri	1978	1,182	223,0	4,8	A
Kigombe	1978	248	729,0	ND	A
Burkina Faso					
Diapaga	1979	539	517,0	10,2	C
Côte d'Ivoire					
Boundiali	1983	414	207,0	ND	A
Ferkessedougou	1985	251	217,0	8,5	A
Korhogo	1985	367	92,0	8,5	A
Tchad, N'Djamena	1988	4.542	826,0	9,5	A
Soudan	1988	32.016	133,0	ND	A
Ethiopie	1989	41.139	83,0	3,9	A
Addis-Abeba	1989	7.000	420,0	ND	A
Kenya, Nairobi	1989	3.800	250,0	9,4	A
Burundi, Ruyigi	1992	1.615	608,0	8,0	A
Burkina Faso	1996	42.129		10,0	A
	1997	22.305		11,3	A
Mali	1996	7.254		11,5	A
	1997	11.228		10,1	A
Niger	1995	26.738			A
	1996	16.145		9,9	A
Nigéria	1996	108.568		11,2	A

\* Pic d'incidence, taux d'attaque p. 100.000. ND = non disponible.

Excerpted from WHO/EMC/BAC/98.3»